Kit AES First YLEA

Référence : 10334



Le kit AES YLEA First est un kit de prise en charge des accidents d'exposition au sang, conçu pour les professionnels et conforme aux exigences du secteur médical et du transport sanitaire.

Utilisez ce kit AES YLEA First pour assurer les premiers soins en cas d'accident d'exposition au sang ou aux risques viraux.

Composition du kit :

- **1** paquet de 5 **compresses stériles 5x5cm.**
- **1 gobelet de rinçage.**
- **1 sac DASRI.**
- **2 paires de gants vinyle non stérile.**
- **1 spray chlorhexidine** 50ml.
- **1 sérum physiologique** 50ml.
- **1 fiche d'information accident AES/AERV.**
- **1 formulaire CERFA.**

Ce produit est disponible en multilangues (Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais et Néerlandais). Grâce à la traduction de sa notice multilingue, elle permet une compréhension facile pour tous les utilisateurs.

En **cas d'accident d'exposition au sang**, il est essentiel de réagir rapidement et de prendre les mesures appropriées pour minimiser les risques de transmission d'infections.

Conduite à tenir en cas d'accident d'exposition au sang :

BESOIN D'AIDE ... CONTACTEZ-NOUS
contact@ylea.eu • www.ylea.eu
Echangez avec nos conseillers par chat du lundi au vendredi de 8h à 17h45.

- **Protégez-vous :** Si vous êtes en contact direct avec le sang, il est important de vous protéger en portant des **gants vinyles jetables**, une **blouse jetable** ou tout autre équipement de protection individuelle (EPI) disponible. Évitez tout contact direct avec le sang ou les fluides corporels.
- **Nettoyez la plaie :** Si vous avez une coupure, une éraflure ou une blessure ouverte suite à l'accident, lavez immédiatement la zone touchée à l'eau courante et au **savon**. Évitez de frotter la plaie, car cela pourrait augmenter le risque de pénétration du sang dans la peau. Appliquez dès que possible de l'**alcool 70°** ou du Dakin qui seuls ont une action sur les virus. A l'issue placez un **pansement** sur la plaie pour protéger d'un risque de contamination.
- **Évaluation du risque :** Il est important de déterminer le niveau de risque d'infection en fonction de la source de sang et de votre propre statut immunitaire. Si la source de sang est inconnue ou si vous êtes exposé à du sang ou tout autre liquide biologique potentiellement infecté (par exemple, d'une personne séropositive pour le VIH, l'hépatite B ou l'hépatite C), vous devez prendre l'accident au sérieux.
- **Lavez vous les mains :** Après avoir réalisé une antisepsie de la plaie à l'aide par exemple l'une **lingette de chlohrexidine**, lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au **savon** pendant au moins 1 minute. Vous pouvez également en l'absence d'un point d'eau utiliser un **gel hydroalcoolique** (lavage par friction de 30 secondes).
- **Signalez l'accident** : Informez immédiatement votre responsable ou le service de santé de votre établissement (par exemple, un infirmier ou un médecin) de l'accident et fournissez autant de détails que possible sur la source du sang.
- **Évaluation médicale :** Consultez un professionnel de la santé dès que possible pour **évaluer le risque d'infection** et discuter des mesures à prendre. Il pourra éventuellement recommander des tests sanguins pour déterminer votre statut immunitaire et préconiser des mesures préventives appropriées.
- **Suivez les protocoles d'urgence :** Selon les directives médicales, il peut être **recommandé de suivre un traitement post-exposition** (par exemple, prophylaxie antirétrovirale pour le VIH) ou de recevoir un vaccin contre l'hépatite B, si vous n'êtes pas déjà immunisé.

Il est essentiel de noter que ces étapes sont générales et qu'il est toujours préférable de suivre les protocoles spécifiques établis par votre employeur, votre établissement de santé ou les autorités sanitaires de votre pays.

Il existe aussi notre kit **YLEA AES YLEA** avec de l'alcool 70°.

Notre **kit pour membre sectionné** est toujours disponible.

? Nos **protections à usage unique professionnelles** conviennent aux besoins des entreprises.