YLEA®

Lot de 6 colliers cervicaux en 2 parties TWISTER

Référence : 10465



Le **lot de 6 colliers cervicaux en 2 parties TWISTER** est spécialement conçu pour offrir un **soutien optimal** et un **soulagement efficace** en cas de douleurs ou traumatismes cervicaux. Ce **dispositif pour le transfert sécurisé de patient** permet de maintenir l'alignement du rachis cervical en toute sécurité, notamment lors du relevage ou du transport.

Chaque collier se compose de deux parties (avant et arrière), fabriquées en **polyéthylène résistant** avec une **doublure intérieure en EVA lavable**, assurant confort et protection contre les frottements.

Caractéristiques :

- Fabriqué en polyéthylène résistant avec doublure interne en EVA lavable.
- Équipé d'un trou central pour la trachéotomie.
- Fermetures Velcro réglables pour un ajustement personnalisé.
- Sans latex pour éviter les réactions allergiques.
- Disponible en 6 tailles différentes avec des fermetures de différentes couleurs pour une identification facile.
- 6 colliers cervicaux Twister avec sac.

Tailles des colliers et leurs couleurs :

- Nourrisson ROSE (de 35 à cm.39) diamètre du cou 6/8.
- Pédiatrique BLEU (de 40 à cm.46) diamètre du cou 8/11.
- VIOLET (de 48 à cm.52) diamètre du cou 16/19.
- Standard BLEU (de 50 à cm.54) diamètre du cou 10/13.
- ORANGE moyen (de 54 à 58 cm) diamètre de cou 13/16.
- Grand VERT (de 56 à cm.60) diamètre du cou 19/25.

YLEA®

Lot de 6 colliers cervicaux en 2 parties TWISTER

Référence : 10465

Entretien :

- Laver à la main avec de l'eau tiède et un savon doux, puis laisser sécher à l'air libre.
- Ne pas utiliser d'agents de blanchiment ou d'assouplissants.
- Vérifiez régulièrement l'état du collier cervical et remplacez le si nécessaire pour garantir un soutien optimal.

Utilisation :

1. **Préparation** : Avant de placer le collier cervical, assurez vous que le patient est stable et sécurisé sur une surface plane.
2. **Choix de la taille** : Sélectionnez la taille appropriée du collier cervical en fonction de la circonférence du cou du patient. Il est important que le collier cervical soit ajusté de manière à fournir un soutien adéquat sans exercer une pression excessive sur le cou.
3. **Installation de la partie arrière** :Tenez la partie arrière du collier cervical et placez la derrière la tête du patient, en veillant à ce que le bord supérieur du collier soit aligné avec la base du crâne.
4. **Installation de la partie avant** :Positionnez la partie avant du collier cervical sous le menton du patient, en veillant à ce qu'elle soit bien ajustée et alignée avec la partie arrière du collier.
5. **Réglage et fixation** : Utilisez les fermetures Velcro pour ajuster le collier cervical de manière à ce qu'il soit bien fixé mais confortable pour le patient. Assurez vous que le collier cervical est positionné de manière à maintenir l'alignement cervical du patient.
6. **Vérification** :Une fois le collier cervical en place, effectuez une vérification visuelle pour vous assurer qu'il est correctement positionné et qu'il offre un soutien adéquat du cou sans restreindre la respiration du patient.
7. **Surveillance continue** : Pendant toute la durée de l'immobilisation cervicale, surveillez régulièrement le patient pour détecter tout signe de détérioration de son état. Assurez-vous également de suivre les protocoles appropriés pour le retrait du collier cervical lorsque cela est nécessaire.

Il est important que ces étapes soient effectuées **par des professionnels du secours formés et qualifiés**, car une mauvaise application du collier cervical pourrait entraîner des complications pour le patient.